

Tiene usted la suerte de encontrarse en un lugar en el que todavía se puede escuchar el canto de los pájaros, caminar por el campo y el bosque o escuchar el sonido del agua en los ríos. Es un paisaje de estructura compleja en donde es posible el encuentro inesperado con fauna difícil de observar en otros lugares. Las llanuras cerealísticas, su situación entre dos ríos, la proximidad de cadenas montañosas, la dedicación forestal de los montes próximos y la abundancia de bosques hacen de esta zona un espacio en el que se da una gran diversidad de ecosistemas. Por ello es una zona rica en especies de fauna. Están censadas más de cien aves, de las que alrededor de veinte son rapaces. En este mural recogemos un buen puñado de las especies de aves diurnas que es posible ver. Especies que buscan su alimento en espacios abiertos como Milano negro, Milano real, Buitre leonado, Aguilucho pálido, Aguilucho cenizo, Busardo ratonero, Culebrera europea, Águila real, Cernícalo vulgar, Esmerejón y Alcotán. Especies que buscan su alimento en bosques como Gavilán común o Águila calzada. Quizás la observación más interesante sea la del Milano real. Una especie que está considerada como en peligro de extinción (EN) en toda España y casi amenazada (Near Threatened NT) a nivel mundial, presenta aquí unos dormitorios invernales compuestos de varios cientos de ejemplares. Dos o tres más aparecen esporádicamente atravesando estos territorios en busca de alimentación o pareja (Halcón peregrino y Alimoche común). No es posible verlas a todas a la vez porque experimentan variación estacional. Algunas residen aquí y las podemos ver todo el año; son las residentes. Otras, las que denominamos invernantes, pasan con nosotros el invierno refugiándose de los fríos europeos y de la escasez de alimento. Por último, las que denominamos estivales, pasan con nosotros el verano después de haber pasado nuestro invierno en el centro de África. Aves cazadoras se alimentan de topillos, ratones e insectos, por lo que son aliadas del agricultor. Durante mucho tiempo han vivido de espaldas uno de otro; esperamos que eso cambie, y la indiferencia se convierta en respeto. Las aves no están aquí esperando a los observadores sino que dedican sus días a la alimentación, los ritos de cortejo y anidamiento en primavera y la alimentación de los pollos en verano. Todas estas aves han sido observadas en nuestro territorio y así consta en los censos realizados. Podremos verlas si tenemos paciencia y un poquito de suerte. Permanecer en silencio, conocer sus hábitos, llevar prismáticos y prendas de colores discretos facilitará la observación de la fauna. Ninguna observación es tan importante que merezca molestar a las aves. Ellas están aquí dedicadas a buscarse la vida en libertad. No las molestemos ni les ocasionemos más dificultades de las que conlleva su propia existencia en la naturaleza. Os deseamos una observación feliz y llena de encuentros interesantes.

Promueve: Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón (Burgos, España)
 Concepción, textos y diseño: © Antonio Sáenz de Santa María. Máster en Biología de la Conservación. De la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). De la Sociedad Franzosi de Ciencia Natural.
 Elaboración: Judith Ayudillo
 Dibujos: © Juan Varela Simó. Con permiso del autor.
 Diseño Gráfico: Laguardasancha maquetación y diseño gráfico

MIRADOR DE LAS RAPACES DEL CONVENTO



ÁGUILA REAL

Golden Eagle (*Aquila chrysaetos*). IUCN: LC. Libro Rojo: NT. L 80-93. E 190-225. Residente reproductor. Escasa. Observación casual.

Es un águila muy grande. De aspecto muy oscuro. Casi negro. Alguna mancha más clara bajo las alas. Pico y "ceras" muy visibles. Bastante silenciosa. Se alimenta de roedores, aves, reptiles, carroña. Anida en los roquedos de la Sierra de la Demanda y campea sobrevolando las vegas de Fresno y sus huertas buscando alimento. Visible todo el año.



CULEBRERA EUROPEA

Short-toed Snake-eagle (*Circus gallicus*). IUCN: LC. Libro Rojo: L62-69. E162-178. Estival reproductor. Abundante. Observación probable.

Es un águila grande, pálida. Con la parte de abajo clara pero cubierta prolijamente de motas oscuras. Alas terminadas en dedos. Capuchón marrón muy visible en los adultos. Llamadas solas o repetidas cuando cría. Se alimenta de culebras, lagartijas, lagartos, que caza en zonas cubiertas de matorral bajo. En una ocasión, en la Loma se vieron cuatro ejemplares en la misma mañana. Eran dos adultos supervisando el vuelo de un juvenil. Era finales de agosto y se preparaban para marchar hacia África. Otro estaba posado sobre un gran fardo de paja. Visible en verano.



AGUILUCHO PÁLIDO

Northern Harrier (*Circus cyaneus*). IUCN: LC. Libro Rojo: L 45-55. E 97-118. Residente reproductor. Escasa. Observación dudosa.

Es más fácil de ver al macho que a la hembra. El macho es un ave blanca de alas finas con puntas negras. Cuerpo muy blanco. Recorre aleteando las laderas de la Loma, los terrenos baldíos y las fincas de cereal. La hembra es más oscura pero con un obispillo blanco resplandeciente. Se alimenta de pequeños roedores y pájaros. Se le puede ver sobrevolando las laderas de la Loma por el Charco. Visible todo el año.



BUITRE LEONADO

Griffon Vulture (*Gyps fulvus*). IUCN: LC. Libro Rojo: L 95-110. E 230-265. Residente reproductor. Abundante. Observación cierta.

Enorme. Muy abundante volando en solitario o haciendo "rondas" para subir alto. Largas alas terminadas en "dedos". Cabeza desnuda y collar blanco. Vuela sin aletear apenas, planeando. Llamada siseante y ronca en carroñadas y dormitorios. El 90% de la población mundial vive en España. Se alimenta de carroña que busca recorriendo decenas de kilómetros diarios. Situándonos en el observatorio del convento de San Vitores podemos verlo pasar a la altura de nuestros ojos. Visible todo el año.



CERNÍCALO VULGAR

Common Kestrel (*Falco tinnunculus*). IUCN: LC. Libro Rojo: VU. L 48-60. E 130-155. Residente reproductor. Abundante. Observación cierta.

Es un halcón pequeño. Espalda marrón rojizo y puntas de las alas grises oscuras. Pasa largas horas en los cables de la luz. Se cierne (conducta de donde le viene el nombre) escrutando el suelo en busca de los topillos y los insectos de que se alimenta. Abundante en Fresno de Río Tirón, anida en los alrededores. A menudo, en primavera los pollos abandonan los nidos antes de tiempo y son recuperados por personas. Si ves alguno, no lo cojas. Los adultos están cerca y se harán cargo del joven. Visible todo el año.



MILANO NEGRO

Black Kite (*Milvus migrans*). IUCN: LC. Libro Rojo: NT. L 48-60. E 130-155. Estival reproductor. Escasa. Observación probable.

Es el milano más común en primavera y verano. Marrón oscuro. Cola oscura de final recto no escotado. Largos silbidos agudos gimoteantes. Se alimenta de carroña, peces muertos, pequeños roedores, insectos grandes. Visible desde marzo hasta agosto.



ÁGUILA CALZADA

Booted Eagle (*Aquila pennata*). IUCN: LC. Libro Rojo: L 42-51. E 110-135. Estival reproductor. Escasa. Observación casual.

Es un águila pequeña. Inconfundible en vuelo por una parte ventral clara y los bordes de las alas muy visibles, oscuros, casi negros. De frente se le ven una mancha blanca en el borde anterior del ala. Reclamo principal cuando cría. Se alimenta de pequeños roedores, aves, lagartos. Es un ave que anida en los bosques cercanos de los Montes de Oca y Pradoluengo. Sobrevuela los árboles del Río Tirón cruzando de un bosque a otro. Visible solo en verano.



AGUILUCHO CENIZO

Montagu's Harrier (*Circus pygargus*). IUCN: LC. Libro Rojo: VU. L 39-50. E 96-116. Estival reproductor. Escasa. Observación dudosa.

Más escaso que el pálido y más pequeño. Machos y hembras muy diferentes. El macho es parecido al del pálido pero más fino, de alas más estrechas y con líneas oscuras en la parte de debajo de las alas. La hembra es más pequeña que la del pálido, oscura, con un obispillo blanco apenas marcado en vuelo. Se alimenta de grandes insectos, reptiles, aves, pequeños mamíferos. Anida en las fincas de cereal por lo que es el aguilucho que puede ser atrapada en las cosechadoras. Se realizan campañas anuales para evitar la mortandad de los pollos durante la recolección. Participa en ellas y evita empacarlos! No ha venido desde África para morir aquí enfardado con la paja...



BUSARDO RATONERO

Common Buzzard (*Buteo buteo*). IUCN: LC. Libro Rojo: NT. L 48-56. E 110-130. Residente reproductor. Abundante. Observación cierta.

Es la rapaz más abundante de la zona. Mediana. Se la ve encaramada en lo alto de los postes junto a la carretera escudriñando en busca de sus presas. Se tira bruscamente, apenas aleteando. Es inconfundible con su librea marrón y la banda clara en el pecho. Hay algunos ejemplares de morfología más blanquecina. A veces se cierne. Se alimenta de ratones, topillos e insectos grandes. Visible todo el año.



ALCOTÁN EUROPEO

Eurasian Hobby (*Falco subbuteo*). IUCN: LC. Libro Rojo: NT. L 29-35. E 70-84. Estival reproductor. Escasa. Observación casual.

Halcón pequeño. Grandes patillas negras en la cara, pecho barrado horizontalmente y vientre rojo. Se alimenta de pájaros y de libélulas y saltamontes. Mientras vuela caza libélulas que devora en el aire sobre el soto del Tirón. De vez en cuando, aparece en los campos de Fresno, se lanza sobre los vencejos, caza uno y se marcha perseguido por los chillidos de los supervivientes. Visible solo en verano.



ESMEREJÓN

Merlin (*Falco columbarius*). IUCN: LC. Libro Rojo: L 25-33. E 55-69. Invernante. Escasa. Observación casual.

Otro halcón pequeño. Aparece como una sombra volando raso sobre los rastros y los matorrales. Sus alas son como hojas de una hoz. Caza pájaros. Cuando desaparece siempre queda la duda de qué hemos visto. Como es el único halcón ornitófago que hay en Fresno en invierno, es fácil concluir que la sombra fugaz que nos ha sobresaltado, más parecida a un bumerán que a un ave, es un esmerejón. Visible en invierno.



GAVILÁN COMÚN

Eurasian Sparrowhawk (*Accipiter nisus*). IUCN: LC. Libro Rojo: VU. L 35-41. E 67-80. L 29-35. E 58-65. Residente reproductor. Escasa. Observación dudosa.

La hembra es mucho más grande que el macho. Espalda gris. Pecho y vientre claro con barras oscuras horizontales. Muy discreto. Caza pájaros. Aunque es un ave forestal, en Fresno caza gorriónes en el interior, entre las casas, aprovechando huertas, matorrales y terrenos baldíos. Visible todo el año.




MILANO REAL

Red Kite (*Milvus milvus*). IUCN: NT. Libro Rojo: EN. L 60-72. E 140-165. Invernante. Abundante. Observación cierta.

Es el único milano que se ve en invierno. Inconfundibles plumas blancas en el codo de las alas. Cola roja y muy escotada. Repetidos largos silbidos en disminución, suave maullido como de gato. Se alimenta de lombrices de tierra, carroña, pequeños roedores. Es fácil verla volando, dirigiéndose al dormitorio o posada en los campos, detrás de los tractores, comiendo lombrices. Se reúne en dormitorios colectivos de varias docenas en los chopos de las orillas del Retorto. Visible desde noviembre hasta febrero.

LAS AVES EN VUELO



IUCN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. SEO/BirdLife: Sociedad Española de Ornitología. Socio español de la Asociación BirdLife International. Categorías Red List IUCN: Least concern (LC) (Preocupación menor), Near threatened (NT) (Casi amenazado), Categories Libro Rojo España: En peligro (EN), Casi amenazado (NT), Vulnerable (VU), Categorías Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial: SI/No (LES/PE), Categorías Catálogo Español de Especies Amenazadas: EN (En peligro de Extinción), Vulnerable (VU) Fenología: residente, invernante, estival. Estado local: reproductor, abundante, escaso. Probabilidad observación: cierta, probable, dudosa, casual. ♀ Hembra, ♂ Macho, Ad./Ado. Adulto/Adultos, juv. Juvenil, Im. Inmaduro, L. Longitud, Tamaño en centímetros del ave estirada desde la punta del pico hasta el extremo de la cola. E. Envergadura. Distancia en centímetros entre los extremos de las alas.

